



**1a** Inflorescència terminada en un grup apical de grans bràctees estèrils, erectes i violàcies o purpurescents, normalment molt densa [a]; corol·la de 6-8 mm, normalment d'un violeta fosc [b].. 2






**1b** Inflorescència no terminada per bràctees estèrils,  $\pm$  laxa [a]; corol·la de 8-12 mm, normalment d'un blau violaci pàl·lid [b]..... 3




**2a** Peduncle de la inflorescència d'1-5 cm [a]; indument format per pèls asteriformes curts, tots  $\pm$  de la mateixa mida [b]; bràctees fèrtils no amplexicaules [c]; mata alta, amb el fullatge grisenc [d]..... [\*L. stoechas\* L. subsp. \*stoechas\*](#)



**2b** Peduncle de la inflorescència de (4)10-32 cm [a]; indument format per pèls asteriformes curts i altres de molt més llargs i reiteradament 2-3-furcats, generalment poc nombrosos [b]; bràctees estèrils  $\pm$  amplexicaules [c]; mata baixa, de fullatge més verdós [d] [\*L. stoechas\* L. subsp. \*pedunculata\*](#)



**3a** Bràctees amplament ovades [a] ; peduncles ordinàriament no ramificats [b]; fulles normalment de 2-3 mm d'amplada [c] ..... [\*L. angustifolia\*](#)



**3b** Bràctees sublinears; [a] inflorescència ordinàriament ramificada [b]; fulles normalment de 5-8 mm d'amplada [c]..... [\*L. latifolia\*](#)

