





1a Tiges normalment ramificades en corimbe a la summitat, amb capítols \pm nombrosos [a]; involucre de 6-12 mm de diàm. [b]; longitud del papus no superior al doble de la de l'aqueni [c].....[S. tinctoria](#)



1b Tiges simples a la part superior, normalment amb un capítol terminal solitari [a]; involucre en general de més de 15 mm de diàm. [b]; longitud del papus ordinàriament doble o triple que la de l'aqueni [c]..... [2](#)



2a Fulles basals subenteres (rarament dentades), les caulinars aglomerades a la part inferior de la tija, ràpidament decreixents, enteres o dentades [a]; bràctees involucrals mucronades, en general no espinoses [b]..... [S. nudicaulis](#)



2b Totes les fulles dentades o profundament dividides, les caulinars ben desenvolupades i distribuïdes per una gran part de la tija [a]; bràctees involucrals amb una espina apical [b]..... [3](#)



3a Flors blanques o groguenques (rarament de color de rosa) [a]; planta glabrescent [b]; fulles en general dentades [c]..... [*S. flavescens*](#)



3b Flors purpúries; planta tomentosa, sobretot a les tiges i als nervis [a]; fulles molt sovint pinnatipartides [b]..... *S. pinnatifida*

