




## ESTAT D'INVASIÓ A LA COSTA BRAVA

Espècie principalment utilitzada per entapissar murs i talussos. Es troba naturalitzada localment a la Costa Brava on pot tenir potencial invasor degut al seu ràpid creixement que li permet una colonització exhaustiva del medi.

## DESCRIPCIÓ

Planta enfiladissa, arbustiva, caducifòlia i vigorosa. Part inferior de la tija llenyosa i la resta voluble. Tiges entortolligades en estructures de suport. Fulles verdes, simples, triangulars, de 3 a 6 cm de llarg, de disposició alterna, amb un pecíol ben desenvolupat, la base en forma de cor i amb el marge dentat. Inflorescències de fins a 15 cm, a les axil·les de les fulles o terminals, laxes i en forma de penjoll. Flors petites (de poc menys d'1 cm de llarg) de color blanc o rosat. Fruit negre i brillant, llis, amb les cares còncaves i de 3 a 5 mm de longitud.



DC

## REPRODUCCIÓ

Floreix de maig a octubre. Tot i que es pot reproduir per llavors, la reproducció principal és via asexual per estolons o rizomes.



DC



DC



La seva resistència als freds intensos afavoreix la seva utilització en jardineria, és per això que està molt més estesa a les contrades de l'interior on les espècies alternatives són poques. Com que necessita certa humitat en climes mediterranis apareix en sòls amb règim hídric més favorable. Generalment, envaeix ambients més o menys ruderalitzats encara que també es pot instal·lar a zones ripàries naturals.



JLP

CCO

## BUSCA-LA AQUÍ

- Cunetes i vores de camins
- Bardisses
- Murs i ruïnes
- Marges de boscos
- Ambients fluvials
- Barrancs d'aigua

## NO LA CONFONGUIS



DC



DC



DC

*Clematis vitalba* ("vidalba", "herba de les llagues")

flors blanc-verdoses formades per 4 sèpals, obertes en estrella i amb nombrosos estams, fruit format per un grup de petites nous rematades en una llarga cua plomosa