



ESTAT D'INVASIÓ A LA COSTA BRAVA

Espècie de condició nadiua dubtosa a Catalunya, on alguns autors l'han considerat possiblement introduïda de territoris propers. És molt probable, però, que les plantes observades a la Costa Brava provinquin d'altres cultivades com a ornamentals.

DESCRIPCIÓ

Planta perenne (a vegades anual o biennal), pilosa i amb base llenyosa, de fins a 50 cm d'alçada. Fulles el·líptiques o oblong-el·líptiques amb marge sencer o sinuat-crenat, de 14 x 2 cm. Flors agrupades en raïm, amb 4 pètals de color purpuri, violaci o blanc i de fins a 1,5 x 1 cm. Fruit en forma de beina llarga, estreta i erecte, i amb una pilositat similar a la de les fulles i la tija. Llavors semicirculars i amplament alades.



PBE

JLP

REPRODUCCIÓ

Floreix entre febrer i juny (agost). Es reproduïx per germinació de llavors que poden dispersar-se pel vent, aigua o animals.



ALLB



ALLB



ALLB



PBE

ECOLOGIA

Creix en indrets calorosos amb plena incidència de llum, tot i que suporta l'ombra. No sobreviu gelades primaverals ni temperatures extremes. Requereix sòls rics i sequedat moderada.

BUSCA-LA AQUÍ

- Fissures i replans costaners
- Talussos
- Terrenys erms
- Murs antics
- Penya-segats
- Zones rocalloses



NO LA CONFONGUIS



Matthiola sinuata ("violer de mar", "violer bord")

color cendrós, fulles dividides, flors de color violeta-rosat i fruits coberts de glàndules