



ESTAT D'INVASIÓ A LA COSTA BRAVA

Espècie en expansió al nostre territori degut a la seva gran adaptació al clima mediterrani i al fet que és tòxica pel bestiar (en no menjar-ne, s'afavoreix el creixement i expansió). Apareix de forma més o menys puntual a la Costa Brava, si bé en altres territoris de Catalunya és una espècie invasora.

DESCRIPCIÓ

Herba de tija erecta, glabre (sense pèls), amb la base llenyosa i de fins a 1 m. Fulles estretament linears, de color verd clar, amb el marge sovint corbat i disposades de forma alterna. Capítols agrupats en forma de panícula, de 1,3 a 2,5 cm de diàmetre i amb de 10 a 15 lígules (pètals de les flors exteriors). Llavors petites, de color marró i amb un papus blanc de 7 mm de llarg.



PBE



PBA

REPRODUCCIÓ

El període de floració és molt llarg, des de maig fins a desembre. Les flors es pol·linitzen per insectes i les llavors es dispersen principalment pel vent però també pels animals. Fa una gran quantitat de llavors, arribant a 10.000 per planta, que poden ser viables durant anys.

CEB



PBA



FC



PBE



ECOLOGIA


Es troba molt adaptada al clima mediterrani i ocupa hàbitats alterats amb sòls remoguts, tot i que quan està molt estesa pot penetrar ambients més naturals.

BUSCA-LA AQUÍ

- Vores de camins
- Herbassars ruderals
- Pastures
- Matollars esclarissats
- Clarianes de bosc



NO LA CONFONGUIS



Senecio pseudolongifolius

ocasional a la Costa Brava, de fins a 2(3) m, amb capítols amb només 5 lígules