



ESTAT D'INVASIÓ A LA COSTA BRAVA

Es cultiva en jardins i es troba naturalitzada localment a la Costa Brava.

DESCRIPCIÓ

Planta perenne enfiladissa. Fulles alternes, peciolades, de fins a 20 cm, enteres, cordiformes o trilobades, suaument pubescents, sobretot a l'anvers. Flors grans en forma d'embut, de fins a 9 cm de diàmetre, de corol·la generalment violàcia-blavosa. Sèpals que s'estenen cap a l'extrem, sense pèls o de pilositat suau. Fruits en càpsula amb 4 llavors.



JMFC

REPRODUCCIÓ

Produeix flors hermafrodites, que s'obren durant el dia i viren a rosat amb el temps. Però com que les llavors que produeix no són viables, la reproducció és asexual i sempre es propaga per fragmentació de les branques, tiges volubles i nusos.



PBE



PBE

ECOLOGIA


Creix en sòls humits, ben drenats, lleugers o arenosos i millor en àrees amb llum directe i temperatures elevades, ja que no tolera caigudes del termòmetre per sota dels 7 °C.



BUSCA-LA AQUÍ

- Bardisses i herbassars ruderalitzats propers a la costa
- Boscos secundaris i pertorbats
- Marges de bosc
- Terrenys de cultiu
- Marges de carreteres i camins
- Barrancs suburbans
- Zones urbanitzades o alterades
- Zones ripàries d'interior (rierols)

NO LA CONFONGUIS



Ipomoea purpurea

planta anual, fulles generalment senceres en forma de cor i flors més petites de 4 a 6 cm amb els pèls dels sèpals rígids