


1a Sèpals erectes durant la florida [a]; pètals amb l'ungla tan llarga com el limbe, o més llarga [b] **2**



1b Sèpals ± patents al temps de la florida [a]; pètals sense unglas o amb unglas molt curtes [b] **3**




2a Fulles llents, orbiculars, amb 5-7 lòbuls obtusos, poc profunds [a]; sèpals fortament carenats i amb rugositats transversals [b]; planta glabra o glabrescent [c] [G. lucidum](#)




2b Fulles palmaticompostes (amb els segments \pm peciolulats) [a]; sèpals no fortament carenats ni gaire rugosos [b]; herba \pm piloso-glandulosa [c]..... [G. robertianum](#)




3a Planta anual (rarament biennial) [a]; pètals de (2)5-8 mm (rarament de 7-10 mm, però en aquest cas no ultrapassen els sèpals) [b] 4



3b Planta perenne, generalment amb un rizoma ± gruixut [a]; pètals de (7)8-18 mm, netament més llargs que els sèpals [b] 10






4a Fulles de 2-7 cm, quasi palmatisectes, amb 5-7 segments estrets dividits en lacínies linears o oblongo-linears [5](#)






4b Fulles no tan profundament dividides, o bé no descompostes en lacínies linears (en algun cas força dividides, però més grans) [6](#)




5a Peduncles més llargs que la fulla corresponent [a]; tiges i pecíols amb pilositat aplicada [b]; pètals de 7-10 mm [c]; mericarps glabres (pilosos al marge i en el bec) [d]..... [G. columbinum](#)




5b Peduncles més curts que la fulla [a]; tiges i pecíols amb pilositat patent [b]; pètals de 4-5 mm [c]; mericarps piloso-glandulosos [d]..... [G. dissectum](#)




6a Segments primaris de les fulles cuneïformes, amb l'amplada màxima prop de l'àpex [a], fulles de contorn orbicular, les inferiors d'1,5-6 cm de diàmetre [b] [7](#)






6b Segments primaris de les fulles atenuats a l'àpex, amb l'amplada màxima aproximadament a la meitat de llur longitud [a]; fulles de contorn poligonal, les inferiors de 3-15 cm de diàmetre [b]..... [9](#)







7a Pètals enters [a]; mericarps llisos, amb pèls patents [b]; fulles molt sovint amb un pic vermell al fons dels sinus [c] [G. rotundifolium](#)



7b Pètals emarginats o bilobats [a]; mericarps glabres i rugosos, o bé pilosos i llisos [b]; fulles sense pics vermells al fons dels sinus [c] [8](#)



8a Pètals de 3-7 mm [a]; mericarps glabres (el bec és pilós), amb rugositat transversals [b]; estams tots fèrtils [c]; tija amb pèls patents d'1,5-2 mm [d] [G. molle](#)



8b Pètals de 2-4 mm [a]; mericarps llisos amb pèls \pm aplicats [b]; 5 estams amb anteres i 5 més d'estèrils [c]; tija amb pèls de 0,1-0,2 mm [d] [G. pusillum](#)



9a Sèpals de 8-12(15) mm, aresta inclosa ; mericarps llisos; pedicels fructífers erectes; fulles amb 5-7 segments ordinàriament pinnatipartits [*G. bohemicum*](#)

9b Sèpals de 3-5 mm [a]; mericarps amb arrugues transversals [b]; pedicels fructífers ± reflexos [c]; fulles amb 3-5 segments dentats o pinnatífids [d] ... [*G. divaricatum*](#)




10a Flors solitàries en general [a]; fulles molt profundament palmatipartides i amb els segments dividits en lacínies sublinears (de vegades els de les fulles inferiors més amples) [b]..... [G. sanguineum](#)




10b Flors normalment a parells [a]; segments foliars no dividits en lacínies linears [b] [11](#)




11a Segments primaris de les fulles cuneïformes, amb l'amplada màxima prop de l'àpex [a]; fulles de contorn orbicular, les inferiors d'1,5-6 cm de diàmetre [b] [12](#)




11b Segments primaris de les fulles atenuats a l'àpex, amb l'amplada màxima aproximadament a la meitat de llur longitud [a]; fulles de contorn poligonal, les inferiors de 3-15 cm de diàmetre [b] [13](#)



12a Tija aèria nul·la o molt curta [a]; peduncles de 5-10 cm, afil·les o amb 2 fulles reduïdes, que solen sortir directament de la base de la planta [b]; pètals de (12)14-16 mm [c] [G. cinereum](#)




12b Tija aèria ben desenvolupada, amb fulles nombroses [a]; pètals de 7-10 mm [b] [G. pyrenaicum](#)



13a Pètals emarginats [a]; segments foliars simplement dentats o feblement pinnatífids [b]



..... [G. nodosum](#)






13b Pètals d'àpex arrodonit o apiculat [a]; segments foliars pinnatipartits o profundament pinnatífids [b] [14](#)




14a Pètals d'un violeta negrós, de 8-10 mm, apiculats [a]; sèpals curtament mucronats [b]; fulles inferiors i mitjanes palmatipartides poc profundament (fins a menys de 3/4 del radi) [c]; mericarps solcats a la part superior [d]; flors planes o amb els pètals reflexos [e] [*G. phaeum*](#)



14b Pètals lilacins, roses o purpuris, de tonalitat viva, de 12-18 mm, amb l'apex arrodonit [a]; sèpals aristats [b]; fulles inferiors i mitjanes molt profundament palmatipartides [c]; mericarps no solcats [d]; flors còncaves [e]..... [15](#)



15a Flors lilacines-blavenques [a]; pedicels \pm reflexos després de la florida [b]; filaments estaminals amplemment ovats a la base [c]; segments foliars en general retallats per sinus profunds en els 2/3 o 3/4 superiors [d] [*G. pratense*](#)



15b Flors d'un púrpura violaci [a]; pedicels erectes després de la florida [b]; filaments estaminals lanceolats a la base [c]; segments foliars no tan dividits [d] [*G. sylvaticum*](#)

